

## Hábitat 9240. Robledales ibéricos con *Quercus faginea* y *Quercus canariensis*.

### 1. Catalogación

Hábitat de interés comunitario.

### 2. Descripción general del hábitat

#### Definición

Bosques dominados por *Quercus faginea*, *Q. canariensis* o *Q. afares*. Presentan unas características parecidas a las de los melojares en cuanto a sus exigencias climáticas, tolerando incluso zonas con relativamente pocas precipitaciones (ombroclima seco superior). En Cantabria están representados por quejigares de *Quercus faginea* subsp. *faginea* desarrollados en sustratos éutrofos,

#### Relaciones con otras clasificaciones

El hábitat 9240 se relaciona con las siguientes formaciones de la clasificación CORINE (1991):

- 41.77. Bosques ibéricos con *Quercus faginea* y *Quercus canariensis* (*Iberian Quercus faginea and Quercus canariensis forest*)

Del mismo modo, el hábitat 3270 se relaciona con las siguientes formaciones de la clasificación Paleártica (Palearctic Classification 1996):

- 41.77. Robledades afro-ibéricas termófilas (*Iberian Quercus faginea and Quercus canariensis forest*)

#### Descripción

- Asociaciones fitosociológicas que lo describen: *Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae*, *Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae*, *Helleboro-Tilietum platyphylli* facies de *Quercus faginea*.
- Plantas características del hábitat: *Quercus faginea* subsp. *faginea*.

#### Subtipos

-**Quejigar castellano-cantábrico**: comunidades del *Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae* (Corine 41.7711), presentes en Campoo, en el ecotono con la aliseda, donde muestra un aspecto robusto y rico en especies nemorales.

-**Quejigar cántabro-euskaldún:** comunidades de la asociación *Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae* (Corine 41.771).

-**Quejigar orocantábrico:** comunidades propias de la asociación *Helleboro-Tilietum platyphylli* facies de *Quercus faginea* (Corine 41.771).

#### Problemas de Interpretación

Los quejigares pueden confundirse principalmente con los robledales de *Quercus pyrenaica* (hábitat 9230), con los que a menudo contactan espacialmente. No obstante, el inicio de la foliación en estos últimos es más tardía que en el caso de los quejigares.

### 3. Distribución del hábitat

#### En la red Natura 2000 en Cantabria




Figura I.39. Distribución del hábitat 9240 en la red Natura 2000 en Cantabria (Fuente: IH Cantabria, 2009).

En la red Natura 2000 en España



Figura I.40. Distribución del hábitat 9240 en la red Natura 2000 de las provincias de la Región Biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica (Fuente: MMARM, 2009).